

ГБОО ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» Красноперекопское отделение

Памятка населению о порядке действий при отравлении хлором

При получении информации об аварии с выбросом хлора необходимо:

- Защитить органы дыхания и поверхность тела. Лицо, нос и рот можно защитить с помощью противогазов всех типов, марлевой повязки, смоченной водой или 20 % раствором соды (1 чайная ложка на стакан воды). Средством защиты кожи может послужить любая накидка. Для защиты от хлора можно использовать промышленные противогазы марок А (коробка коричневого цвета), БКФ (защитного), В (жёлтого), Г (половина чёрная, половина жёлтая), а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 и детские. Из простейших средств защиты можно использовать ватно-марлевую повязку, смоченную водой, а лучше 2% раствором питьевой соды.
- **Покинуть район аварии** в направлении, указанном в сообщении. Вне помещения выходить из зоны химического заражения следует в сторону, перпендикулярную направлению ветра. Избегайте перехода через туннели, овраги и лощины, так как в низких местах концентрация хлора будет выше.
- Если из опасной зоны выйти невозможно, нужно остаться в помещении и произвести его герметизацию: плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам. Входные двери зашторьте, используя одеяла и любые плотные ткани. При возможности поднимитесь на верхние этажи здания. Нельзя укрываться на первых этажах многоэтажных зданий, в подвальных и полуподвальных помещениях.
 - Оказавшись вне опасной зоны, нужно снять верхнюю одежду и оставить её на улице.
 - Как можно быстрее принять душ, промыть глаза и носоглотку.
- **Наблюдать за своим самочувствием**, при первом появлении признаков отравления обратиться к врачу. В ожидании помощи пострадавшему необходим покой и тёплое питьё.
- Пострадавшего от отравления хлором нужно как можно быстрее вынести из опасной зоны. При транспортировке пострадавший должен быть в горизонтальном положении. Вне опасной зоны снимите с пострадавшего всю одежду, стесняющую дыхание, и уложите в горизонтальное положение. Необходимо обеспечить покой, тепло, приток свежего воздуха.

В ожидании медицинской помощи рекомендуется:

обильное тёплое питьё -2 % раствор соды, боржоми, молоко с содой, чай, кофе;

при кашле или першении в горле необходимы тёпло-влажные ингаляции 2 % раствором соды, противокашлевые препараты;

при слезотечении, жжении в глазах – промывание глаз водой или 2 % раствором соды. Этим же раствором нужно промыть нос. В глаза можно закапать 30 % раствор альбуцида;

при обмороке — надо дать понюхать нашатырный спирт. При отсутствии дыхания немедленно приступить к реанимационным действиям.


Рекомендуется затемнить помещение. При первой возможности пострадавшие должны доставляться в ближайшее лечебное учреждение для обследования и дальнейшего лечения.



Действия при аварии с выбросом хлора

XЛОР - газ желго-зеленого цвета с резким раздражающим специфическим запахом. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 раза. Скапливается в низнах, затекает в подвалы, движется в приземных слоях атмосферы. Пары раздражают слизистые оболочки, кожу, дыхательные пути и глаза, появляется резкая загрудинная боль, сухой кашель, реота, нарушение координации, отдышка, резь в глазах, слезоточение. При высоких концентрациях возможен смертельный исход.





При получении информации о выбросе хлора в атмосферу

Увочите из информации место вварни и направление распространения ядовитого облака

Закройте плотно все форточки, окна, двери

Выключите оконные и чердичные вентиляторы, закройте вентиляционные люки и отверстия Приготнейе домациною аптечеу, проверите наличие в ней берной и тивночной икполь, альбущиць, опнеского и перочавего масла, литьеной соды. При уходе возычите ее с собой

Приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи Намедленно зыходите из эслы зархимент, дестако, окруженте, дестако, вегра. Наиболее безопасное месть зархиме этами высотных заями. Пре необходимости може укрыться в бликовация зарутном собходимости.